

# 「高泌乳牛の移行期の栄養管理 と周産期病の予防」

京都大学大学院農学研究科  
久米新一

# 移行期の栄養管理の重要性

## --乳牛の栄養管理のFinal Frontier

移行期 (Transition Period)とは


分娩前3週間と分娩後3週間の期間:  
栄養管理の最も難しい時期 (1995年の  
J.Animal Scienceの3編の論文を契機)



移行期の栄養管理が不十分だと

--代謝障害・周産期病の増加、乳生産・繁殖成績の低下

# 図、乳量増加と乳牛の生体機能 (牛群検定: 北海道(◆)と都府県(■))



- 乳牛の乳量が増したが、  
遺伝子・細胞・組織・器官  
の何が変わったか？  
体内代謝が活発になり、酸  
素消費量・血流量が増加



- 後継牛の遺伝的能力は母  
牛より高い -- 周産期病発  
生のリスクが高まる



- 栄養管理の改善が常に必要

高泌乳牛: 摂取した栄養素を  
乳生産に優先的に利用する

# 別海の酪農家



乳量:約1,100t  
経産牛:110頭  
(計200頭)  
飼料畑:110ha

# 帯広の酪農家







飼養頭数：900頭  
出荷乳量：6,000t  
(ロータリーパーラー  
：3回搾乳)

フリーバーン




# 図、分娩直後の乳牛の特徴：乳量の急増と不十分な乾物摂取量による栄養不足



# 周産期病の発生要因は？


- ・高泌乳牛では遺伝的能力が向上したため、分娩時のリスクが高まっている
  - NEFA増加、低Ca血症はほとんどの高泌乳牛で生じる
- ・不適切な飼養管理が加わると代謝機能が阻害され、周産期病が多発する
  - 乾物摂取量・乳量の減少、受胎率低下、淘汰につながる





# 周産期病の予防は？

- ・高泌乳牛では一つの周産期病が発生すると、他の周産期病も発生しやすい



- ・高泌乳牛の体内代謝を正常化する、総合的な栄養管理を実践し、周産期病を予防する
- ・周産期病の予防（優先順位）
  - エネルギー（乾物摂取量）不足と低Ca血症の改善が重要


# 高泌乳牛の代謝特性と周産期病

- ・体内代謝の急激な変動(代謝・内分泌・免疫機能): **周産期病のリスク要因**
- ・栄養管理などの不備: **周産期病の増加**
- ・周産期の免疫機能の低下: **乳房炎、胎盤停滞などの増加**

# 泌乳開始による乳腺のしくみ

- ・ **血流量・栄養素の増加**—乳量・乳成分の増加
- ・ **乳腺の免疫成分の増加**—子牛の疾病予防と

乳房炎の予防(乳頭口から病原菌の侵入)




乳生産のためにブドウ糖とアミノ酸が大量に必要

表, 分娩1週間前(3日間)と分娩2-4日後(3日間)の乾物摂取量(n=4)


	分娩前		分娩後	
	グラス	アルファルファ	グラス	アルファルファ
体重, kg	754	733	711	643
増体, kg/日	0.15	0.65	-4.79	-6.50
DMI, kg/日	10.0	11.0	13.3	13.3
乳量, kg/日			29.5	31.9
乾物消化率, %	74.1	70.8	71.6	73.1
CP消化率, %	71.8	70.8	70.5	72.5
N蓄積量, g/日	49	64	-93	-72

分娩直後: 消化率は高いが、エネルギーと窒素が不足




図、分娩直後の乳牛のエネルギー代謝

# 乳牛のエネルギー利用



- ・酢酸の78%は骨格筋、心筋、乳腺などで消費  
(末梢血VFAの95%は酢酸:エネルギー源)
- ・分娩直後には筋肉のアミノ酸などから、糖新生でグルコースの産生が必要になる  
(タンパク質をエネルギーとして使いたくない)

# 図、乳牛の乳量と乳糖の関係 (グルコースの必要性)



乳量増加は乳糖(グルコース)の増加が重要: 浸透圧の関係(乳糖が多いと乳腺に水の移行が増加する)

# ケトーシス・脂肪肝の発生

**ケトーシス**: 分娩直後の体脂肪の大量動員により血中遊離脂肪酸が急増して脂肪酸代謝障害が生じると、体内にアセト酢酸などのケトン体が増加し、痙攣、麻痺などの脳・神経障害につながる(糖質不足:血糖値低下)



**脂肪肝**: 肝臓に大量に動員された脂肪を処理できなくなると、大量のケトン体の生成による重度の中毒症状と肝機能の減退を示す



分娩直後～10日頃までのエネルギー代謝異常(不足)によるケトーシス・脂肪肝が問題(1980年代:分娩2～4週後に多発)




# 図、初乳中への免疫・栄養成分の分泌 --子牛の健康維持と乳房炎の予防



・初乳量の急増による乳中への**カルシウムとリン**の多量分泌が乳熱発生要因になる

# 乳牛の分娩直後のCa代謝と乳熱



乳熱発生要因: 血漿中のCa貯蔵量が少ないため、初乳中への急激なCa分泌に対応できない

# NRC2001の乳熱発生要因

1) KあるいはNa過剰摂取による代謝性アルカローシス



副甲状腺ホルモン(PTH)受容体の機能低下



活性型ビタミンD低下によるCa吸収量減少・  
骨吸収減少

2) 妊娠牛の低Mg血症



PTH分泌量減少とPTH受容体の機能低下


# 表、飼料のミネラル含量(乾物当たり%)とイオンバランス(DCAD)

	Na	K	Cl	S	DCAD
配合飼料	0.10	0.81	0.20	0.22	59
大豆粕	0.02	2.33	0.02	0.40	350
イタリアンライグラス	0.08	3.13	1.79	0.24	184
アルファルファ	0.05	3.23	1.02	0.29	379
オーチャートグラス	0.27	2.11	1.17	0.21	200
コーンサイレージ	0.03	1.00	0.27	0.09	139

注)  $DCAD = ((Na/23.0 + K/39.1) - (Cl/35.5 + S/16.0)) \times 10,000$  (ミリ当量/kg)

・わが国では牧草のカリウム含量が非常に高い

# 図、グラス区(◆)、アルファルファ-正常(▲)、アルファルファ-乳熱(■)の血液成分



アルファルファ給与による乳熱発生: K含量の高いこと(3.4%)が一因である

# 周産期病発生のリスク要因

1. 分娩前後の体内代謝・内分泌機能の急激な変動（乳生産の増加が影響）
  - 代謝障害・繁殖障害の増加
2. 分娩前後の免疫機能の低下
  - 病原菌の体内侵入による乳房炎などの疾病増加（乳腺にIgGが多いことは細菌感染から乳腺を保護している）



高泌乳牛は分娩に伴うリスクが高く、精密な栄養管理による周産期病の予防が必要

# 移行期の課題と飼料給与

- ・栄養管理の改善が乳量増加に追いつかない
- ・粗飼料(イネ科)の品質が改善されない



- 1) 分娩直後の乾物摂取量の早期増加を図る
- 2) 飼料から栄養素を過不足なく摂取する
- 3) ルーメン環境の適正維持と絨毛の発達促進



良質粗飼料を活用して、TMRで給与する

- ・分娩前の濃厚飼料の給与比率を3割程度
- ・移行期はほぼ同じ粗飼料構成にする

# 良質粗飼料を活用した エネルギー代謝の改善

- ・移行期には良質粗飼料の給与が重要：  
栄養価が高く、乾物摂取量が増加する
- ・高泌乳牛は飼料の利用効率（吸収率・代謝率）が向上--乳量増加につながる





# 給与飼料(サイレージ)の成分含量(DM%)

:トウモロコシサイレージは大豆粕を添加


	イネ科牧草	アルファルファ	トウモロコシ
CP	11.9	18.3	11.1
NDF	61.9	44.9	37.8
ADF	37.2	35.3	23.3
NDICP	2.6	2.4	0.7
ADICP	0.6	1.1	0.5
ADL	4.6	7.0	3.2
EE	4.2	4.3	3.2
Ash	6.9	10.5	5.3

# 図、サイレージのTDNと飼料中 ADF・ADL 含量の関係



良質粗飼料はTDNが高い(70%以上)

# 図、乾乳牛と泌乳牛（粗濃比：60:40、乳量：30.1kg）のエネルギー代謝（HP;熱発生量）




TDN (%)	67.8	62.7	74.5
代謝率 (%)	52.8	51.7	59.6
HP (MJ/日)	85.2	71.6	76.0

泌乳牛	69.7
代謝率 (%)	59.8
HP (MJ/日)	113.0



# 周産期の乳牛の飼養管理:

グラス区は遺伝的能力を満たしていない飼い方




図、アルファルファ給与区 (◆;n=7)、グラス給与区 (■;n=6)、コーン+アルファルファ給与区(▲;n=4)の乾物摂取量と乳量  
分娩後の粗濃比: 50:50(グラス、アルファルファ)、60:40(コーン).  
分娩前の粗濃比: 70:30(各給与区とも)

# 図、アルファルファ給与区 (◆;n=4) とコーン+アルファルファ給与区(▲;n=4)の乾物摂取量と乳量



高泌乳牛: 分娩直後の乳量の急増が特徴


図、アルファルファ給与区 (◆:n=4) とコーン＋アルファルファ給与区(▲:n=4)の血液成分



分娩直後における血漿中遊離脂肪酸の急増・グルコースの低下とその後の回復


# 泌乳牛の体重とDMI/体重:

目標: 泌乳前期のDMI/体重を4%以上



図、アルファルファ給与区 (◆;n=7)、グラス給与区 (■;n=6)、コーン+アルファルファ給与区(▲;n=4)



# アルファルファとグラスサイレージ給与と牛の乾物摂取量と反芻胃内滞留時間の関係（上田ら、2004）



アルファルファは消化管通過速度が速い: **DMIが多い**  
サイレージ(約2cm), 大飼料片(5mm), 小飼料片(1mm)




# 泌乳牛のエネルギーとタンパク質の充足率(日本飼養標準)



図、アルファルファ給与区 (◆;n=7)、グラス給与区 (■;n=6)、コーン+アルファルファ給与区(▲;n=4)のTDNとCP充足率

グラス給与区では乳量が少なく、TDNの充足率も低い  
: 周産期の栄養管理でもっとも問題の多い飼養法

# 泌乳牛のCaとPの充足率 (日本飼養標準)




図、アルファルファ区 (◆;n=7)、グラス区 (■;n=6)、コーン+アルファルファ区(▲;n=4)のTDNとCP充足率

ミネラルではPの充足率が低い

# 表, アルファアルファ給与牛の 繁殖成績(山田ら)

	グラス区	アルファアルファ区
例数	14	13
初回排卵、日	35±18	37±19
受胎までの日数	94±33	102±30
受精回数、回	1.4±0.7	2.0±0.9
受胎頭数	13/14	12/13

# 図、乾乳牛と泌乳牛（乳量：29.5kg） の水摂取量と水損失量



乳牛は分娩直後に大量の飲料水を必要とする

表、乾物摂取量、水摂取量(飼料水+飲水)  
(TWI)と飲水量(DWI)の比較(kg/日)

	乾乳牛	泌乳牛	泌乳牛/乾乳牛
DMI	7.7	20.7	2.69
TWI	30.3	98.4	3.25
DWI	16.0	77.6	4.85

分娩前と比較して、泌乳牛では乾物摂取量の増加率よりも飲水量の増加率が高い：  
水が飲めないとは代謝異常になる